



地鶏特性解明調査報告書Ⅱ

平成 30 年 3 月

一般社団法人 日本食鳥協会

目 次

平成 29 年度 地鶏を特徴づける科学的検証等検討会 報告書 1

日本獣医生命科学大学

江草 愛

1. 鶏の起源と種類	1
2. 地鶏の特長	3
(1) 名古屋コーチン	3
(2) 比内地鶏	3
(3) 東京しゃも（銘柄鶏）	3
(4) はかた地どり	4
3. 鶏肉の特長	4
(1) 鶏肉の栄養素	4
(2) 鶏肉のおいしさ	6
①鶏肉の味	6
②鶏肉の香り	6
③鶏肉の食感	7
4. 本プロジェクトの目的	7
<u><実験方法></u>	
1. 実験材料	8
2. 一般成分分析（水分、脂質、タンパク質、灰分、炭水化物）	8
3. 脂肪酸組成の分析	8
4. 官能評価法	8
5. 香気成分の分析方法	11
6. テクスチャー分析	11
<u><実験結果および考察></u>	
1. 一般組成とビタミン B1（チアミン）含量	11
(1) ムネ肉	11
(2) モモ肉	14
2. 脂肪酸組成	16
(1) ムネ肉	16
(2) モモ肉	22
3. 地鶏の食味性の違い	26
(1) ムネ肉	27
(2) モモ肉	30
4. GC-O と GC-MS を用いた鶏肉香気成分比較と物質の同定	34
5. 地鶏の硬さの評価	40
6. 今後の課題	41
【参考文献】	42

平成 29 年度 地鶏を特徴づける科学的検証等検討会 報告書

日本獣医生命科学大学

江草 愛

<背景>

本プロジェクトでは、昨年度に引き続き、地鶏の種類の違いによる食味性の違いを科学的に検討することとした。以下に、国産鶏肉の種類や鶏肉の特長に関して概説し、本報告書の考察に資することとする。

1. 鶏の起源と種類

鶏は紀元前 6000 年頃に、東南アジアで赤色野鶏を起源として家禽化されたと考えられている¹⁾。日本で発見された最も古い鶏の骨は弥生時代の遺跡から発見されており、日本列島への渡来人によって紀元前 1 世紀頃に伝來したと考えられている²⁾。本国に生息する鶏の B 血液型古い遺伝子座にある 5 種類の亜型 (A, B, G, K, M) について解析したところ、台湾地鶏、シマドリ、トカラ地鶏、薩摩鶏、比内鶏は BG、BM 遺伝子の出現頻度が高く、西南諸島から南ルートが渡來したのに対し、赤色野鶏の形質をとどめた岐阜地鶏は BA 型、伊勢地鶏は BM 型の遺伝子のみを持っており、朝鮮半島からの北ルートで伝播したと考えられている³⁾。

鶏は世界中で約 300 の品種が存在すると推定されており、特に日本で作出された鶏は日本鶏と呼ばれ、表 1 に示す品種が知られている。この内、地鶏と軍鶏及びその他 15 種を合わせて 17 種が天然記念物に指定されている。

表 1. 日本鶏の分類

天然記念物 (17種)	地鶏	土佐地鶏 三重地鶏 岐阜地鶏 岩手地鶏
	軍鶏	大軍鶏 八木地鶏 大和軍鶏 金八鶏 小軍鶏 南京軍鶏 越後南京軍鶏
	その他	小国鶏 矮鶏 烏骨鶏 声良鶏 比内鶏 蜀鶏 蓑曳鶏
		河内奴鶏 黒柏鶏 東天紅鶏 蓑曳矮鶏 鶏矮鶏 薩摩鶏 地頭鶏 土佐のオナガドリ
その他 (19種)	雁鶏	会津地鶏 芝鶏 愛媛地鶏 久連子鶏 龍神地鶏 徳地地鶏 トカラ地鶏 佐渡鬆地鶏
	チャーン	名古屋 三河 出雲 土佐九斤 宮地鶏 対馬地鶏 熊本 天草大王 インギー鶏

国産鶏は、肉資源となる肉用鶏と採卵を目的とした採卵鶏に分類される。そのうち、肉用鶏は、一般的には、ブロイラー（若どり）、銘柄鶏並びに地鶏に分類される。

ブロイラーは、主に白色コーニッシュ種と白色プリマスロックを交配したものが多い。成長が早く、肉づきが良いという特徴があり、通常、体重が3kgほどに成長する約50日齢で出荷される。現在、世界的種鶏会社で飼育されているブロイラーは、“チャンキー”、“アーバーエーカー”、並びに“コブ”といった名称で呼ばれている。平成25年度に日本で処理されたブロイラーの処理羽数は、約6億6994万（銘柄鶏向けを含む）で、国内での総処理羽数の大部分を占めている。

銘柄鶏は、ブロイラーと異なる鶏種の使用、飼育期間の延長、特殊な飼料で飼育、または放し飼いなど、飼育方法を工夫し、ブランド名をつけた鶏のことである。

地鶏は、日本の在来鶏やそれを他の鶏と交配して作出されたものである。農林水産省が制定した日本農林規格（JAS）により定義されており、それによれば地鶏は、明治時代までに我が国に導入され、定着した38種を「日本在来種」（表2）と定義し、その純系によるもの、又はその血液百分率が50%以上で、出生証明が出来るひなを用いたもので「28日齢以降は平飼いで1平方メートル当たり10羽以下で75日以上飼育した鶏」とされている。これに加え、JASで認定された地鶏肉生産工程管理者が生産、又は小分けした地鶏の肉に対して、特定JASマークが表示できるようになった。現在、JASマークが表示できる地鶏肉としては、徳島県の「阿波尾鶏」、福岡県の「はかた地どり」、岐阜県の「奥美濃古地鶏」などがある。

表2. 日本在来種とされている鶏の品種

会津地鶏・伊勢地鶏・岩手地鶏・インギー鶏・烏骨鶏・鶴矮鶏・ウタイチャーン・エーコク・横斑プリマスロック・沖縄巣地鶏・尾長鶏・河内奴鶏・雁鶏・岐阜地鶏・熊本種・久連子鶏・黒柏鶏・コーチン・声良鶏・薩摩鶏・佐渡巣地鶏・地頭鶏・芝鶏・軍鶏（シャモ）・小国鶏・矮鶏・東天紅鶏・蜀鶏・土佐九斤・土佐地鶏・対馬地鶏・名古屋種・比内鶏・三河種・蓑曳矮鶏・蓑曳鶏・宮地鶏・ロードアイランドレッド

2. 地鶏の特長

(1) 名古屋コーチン

名古屋コーチンは、明治時代の初めに中国から入手したバフコーチンと尾張地方にいた岐阜地鶏を交配して作出された。他の地鶏は、在来種と肥育専用の外国鶏とを交配させた交雑鶏であるが、名古屋コーチンは、他の鶏と交配させることなく、純血のままを保っている。名古屋コーチンの特長は、肉質、産卵能力が良く、強健で温厚であることである。名古屋コーチンの出荷日齢は、120～150日で、オスの方がメスのものより早く出荷される傾向がある。長期間肥育するため、名古屋コーチンの肉は、コクのある旨みや締まった歯ごたえが強いことが特長であると言われている。

名古屋コーチンは、「かしわのひきずり」と呼ばれる郷土のなべ料理にも使用されている。「かしわ」は鶏肉を、「ひきずり」はすき焼き鍋のことをいうが、名古屋コーチンは、煮る条件や味付けなどに関して尾張地方独自の調理方法で調理される鍋料理の素材として広く利用されている。それ以外にも、串焼き、刺身、鶏飯などのメニューにも使用されている。

(2) 比内地鶏

食用として利用されている比内地鶏は、昭和48年に秋田県畜産試験場が、在来種である比内鶏の雄と米国産のロードアイランドレッド種をかけ合せた一代雑種の鶏である。飼育方法は、生まれた直後30日齢までは保育器で育て、その後1週間ほど簡易鶏舎で飼育した後、120日以上牧草地での「放し飼い」または、「平飼い」で飼育するものである。比内鶏は、観賞用や易占として利用されていた。元来、身体が小さく、病弱であったことから飼育に向いていなかった。また、昭和17年に天然記念物に指定され、食用に利用できなくなつたことから、食用の比内地鶏を作出した。食用の比内地鶏は、肉の味が良い雌の肉が好まれている。

比内地鶏の肉の特長は、赤みが強く、適度な歯ごたえがあると同時に、キジやヤマドリのような風味を持っていることである。肉を噛めば噛むほど、深い味わいを感じることができる。「きりたんぽ鍋」で、肉を鍋に入れた時、細やかな脂肪が浮き、鶏肉本来の香りを楽しむことができると言われている。

(3) 東京しゃも（銘柄鶏）

東京しゃもは、気性が激しく、群れ飼いをすることが難しかった純粋軍鶏を、東京都畜産試験場が「戻し交配法」を用いて、育種・選抜改良して作出したものである。具体的には、ロードアイランドレッドの雄と軍鶏の雌をかけ合せたできたF1の雌に、再度軍鶏雄をかけ合せて作出したもので、軍鶏純度が75%になっている。この改良により、闘争性が弱く、群で飼育することが可能となった。また、東京しゃもの肥育日数は、短くて150日、長いものは210日齢まで肥育することで、その特長が引き出されている。尚、東京しゃもはケージ飼いのため、厳密には地鶏ではないが、その肉質の良さが高く評価されており、

その肉質の特長は、脂肪が少なくあっさりしているが、歯ごたえのある食感が特長である。歯ごたえは、日齢が長くなればなるほど、大きくなる。東京しゃもの肉の特長を活かすには、「すき焼き」のように、濃い出汁で煮炊きする料理が推奨される。

(4) はかた地どり

はかた地どりは、日本在来種の軍鶏と「サザナミ」をかけ合せた地鶏として作出されてから 30 年余りが経過した。1 年間生産量は、平成 11 年度の 127000 羽が、平成 26 年度には、約 3.5 倍の 430000 羽になった。

肉質の特長は、歯ごたえがあるが、筋原線維のキメが細かいことである。また、嗜むことにより、肉の味わいが濃くなることである。はかた地どりは、福岡県の郷土料理である筑前煮や水炊きをおいしくする素材であるが、から揚げとしても適していることが知られている。

3. 鶏肉の特長

(1) 鶏肉の栄養素

鶏肉は、牛肉や豚肉と同様に、良質のタンパク質、ミネラル、ビタミンを含んでおり、これらの供給源として、重要な役割を果たしている。

私たちの体を構成するタンパク質は、1 万種類以上あると言われており、それらは一定期間で新しいタンパク質につくり替えられている。この時に原料となるタンパク質の一部は、食べ物のタンパク質が消化・吸収されたアミノ酸である。そのため、厚生労働省が発表した成人男性および女性が 1 日に摂取すべきタンパク質は、それぞれ 60 グラムおよび 50 グラムとされている。

若鶏のムネ肉並びにモモ肉には、100 グラム中にタンパク質が 22.3 グラム並びに 18.8 グラム含まれている（表 3）。また、これらのタンパク質を構成するアミノ酸には、必須アミノ酸がバランスよく含まれているので、鶏肉は、良質のタンパク質を摂取するために、極めて優れた食品素材と言える。

表3. 各種食肉可食部100グラムに含まれる栄養素の含量

食品	エネルギー	水分	タンパク質	脂質	炭水化	灰分	鉄	ビタミンB1	
	kcal	(. . . g . . .)					mg	μg	mg
和牛サーロイン	456	43.7	12.9	42.5	0.3	0.6	<u>0.8</u>	3	0.05
乳用肥育牛サーロイン	270	60	18.4	20.2	0.5	0.9	<u>0.8</u>	7	0.06
豚ロース	202	65.7	21.1	11.9	0.3	1	0.3	5	<u>0.75</u>
成鶏むね(皮なし、生)	121	72.8	24.4	1.9	0	0.9	0.4	<u>50</u>	0.06
成鶏むね(皮つき、生)	244	62.6	19.5	17.2	0	0.7	0.3	<u>72</u>	0.05
成鶏もも(皮なし、生)	138	72.3	22	4.8	0	0.9	<u>2.1</u>	17	0.1
若鶏むね(皮なし、生)	108	75.2	22.3	1.5	0	1	0.2	8	0.08
若鶏むね(皮つき、生)	191	68.0	19.5	11.6	0	0.9	0.3	<u>32</u>	0.07
若鶏もも(皮なし、生)	116	76.3	18.8	3.9	0	1	<u>0.7</u>	18	0.08

(「七訂 日本食品標準成分表2015」より、引用)

鶏肉は、牛肉や豚肉と比べて脂質含量が少なく、皮なしのムネ肉とモモ肉で、それぞれ1.5および3.9%である。脂肪の摂取を控えめにしたい場合の食肉としては、鶏肉が最も良い。また、脂肪の脂肪酸比率でも、表4に示すように、牛肉や豚肉と比べて、多価不飽和脂肪酸の占める割合が多く、ヒトが脂肪の摂取で理想とされている脂肪酸比率に近いものとなっている。

表4. 各種肉の脂肪における脂肪酸の比率

脂肪酸の種類 理想的比率	飽和脂肪酸			：一価不飽和脂肪酸	：	多価不飽和脂肪酸
	3	：	4	：	3	
鶏肉	3.0	：	3.8	：	0.4	
牛肉	3.0	：	3.8	：	1.1	
豚肉	3.0	：	4.4	：	1.6	

注) 飽和脂肪酸の含量を3.0に合わせて、比率を算出した。

鶏肉に含まれる特徴的な栄養素としては、ビタミンAがある。ビタミンAは、皮膚や粘膜、眼の健康を保つ作用や抗酸化作用を有することが知られている。特に、鶏肉の皮の部分に含まれている。

この他、特に鶏肉に多い機能性物質としてカルノシンとアンセリンが挙げられる。この2つの物質はヒスチジンと β アラニン、あるいは1-メチルヒスチジンと β アラニンからなるジペプチドでありイミダゾールジペプチドと総称されている。カルノシンやアンセリンの摂取により、運動時における筋pHの低下を押さえて運動機能を向上させる作用や、疲労回復の効果、及び抗酸化作用などが報告されている³⁾。ブロイラーのムネ肉には20 mM、地鶏のムネ肉には40 mM以上のカルノシンとアンセリンが含まれており、いずれも50 gを喫食すれば、疲労回復の効果に十分な量のカルノシンとアンセリンが摂取できる。

(2) 鶏肉のおいしさ

おいしさを決める要因として、味、香り並びに食感などが重要である。

① 鶏肉の味

味では、うま味が食肉の美味しさに重要な役割を果たしている⁴⁾。鶏肉は、牛肉や豚肉と比べてうま味成分であるグルタミン酸とイノシン酸が多い。これらのうま味成分の含量は、鶏肉の部位によって異なっている。と鳥後、4°Cで2日間貯蔵した肉のイノシン酸量を調べると、ムネ肉の含量がモモ肉のものより多い。また、グルタミン酸量は、モモ肉の含量がムネ肉のものより多いことが分かっている。

② 鶏肉の香り

香りもおいしさの決定に重要な役割をしている。食肉の香りは、大きく2つに分けられる。1つは、赤身部分を加熱した時に生成される加熱香氣で、もう1つは脂肪由来の加熱香氣である。前者は、肉の種類によってあまり変わらない香りであり、赤身に含まれる水溶性成分同士が加熱によりメイラード反応を起こし、生成される。代表的な香氣成分として、硫黄化合物、フラン化合物、ピラジン化合物、アルデヒド化合物が知られている。一方、後の香りは、食肉を食べた時に動物種を識別できる動物種に特異的なものである。あまり研究が進んでおらず、これまでに知られているのは、和牛と鶏肉の特徴的な香りを分析したものがある。

すき焼きなどで和牛を煮た時に和牛香と呼ばれる甘い香りが生じるが、これは脂質由来のラクトン化合物によることが明らかにされている⁵⁾。また、蒸したり、ゆでた鶏肉では、2-methyl-3-furanthiol、2-furfurylthiol、3-(methylthio)propanal、methanethiol、2,4,5-trimethylthiazole、nonanal、2(E)-nonenal、2-formyl-5-methylthiophene、*p*-crezol、

(*E, E*)-2, 4-nonadienal、(*E, E*)-2, 4-decadienal、2-undecenal、 β -ionone、 γ -decalactone、 γ -dodecalactone、hexanal、octanal、acetaldehyde が寄与成分として重要であることが示されている。中でも鶏肉の特徴的な香りとして、2, 4-デカジエナールが重要であると考えられている⁵⁻⁷⁾。

肉の香りは、主に加熱により生ずるが、その前駆体の多くは、と畜後の筋肉の保存条件によって大きく異なることが考えられる。例えば、鶏肉の場合に、多価不飽和脂肪酸の比率が高いため、保存条件によって脂質が酸化され、不快臭の発生につながる可能性が高い。この不快臭は、おいしさに重要な香りを消してしまい、おいしさの損失に繋がってしまうので特に注意が必要である。

③鶏肉の食感

食感もおいしさを決める重要な要因である。一般的には、軟らかくてジューシーな食肉が好まれる。鶏肉も軟らかい肉がおいしいと感じるヒトもいるが、地鶏などの肉で感じる少し歯ごたえがある硬いものを好むヒトもいる。ブロイラーは、50 日程度の飼育後に、出荷されるため、肉質が軟らかいのが特徴である。地鶏は、75 日以上の飼育が必要であることから、組織がブロイラーのものより丈夫になるので、歯ごたえが感じられる肉質となる⁸⁾。

4. 本プロジェクトの目的

地鶏は、全国で生産されている羽数は非常に少ないが、その肉質に特徴があるとされており、各地で小規模ながら根強く生産されている。また、各地鶏は、それぞれの生産地で特長を活かした料理に使用されている。しかし、地鶏の特長に関する科学的証拠は未だ十分とは言えず、それぞれの特長が十分に活用されていない可能性がある。

本プロジェクトは、地鶏の特長を科学的に証明すると同時に、それぞれの特長を活かした調理方法を見出すことを最終目的としている。

昨年度は、東京しゃも、名古屋コーチン、比内地鶏、はかた地どりの 4 種を用いて、皮を除いた筋肉部分の一般栄養成分分析（水分量、タンパク質量、脂肪量、灰分量、炭水化物量）と脂肪酸組成の測定、機能性成分であるアンセリン・カルノシン量の測定を行った。また、皮と筋肉部分の両方を用いて、官能評価を用いた食味性の特徴付けて、香りの特性の違いを GC/MS を用いて調査した。

平成 29 年度は実際に喫食した際の特徴を理化学分析の結果と対応させるために、筋肉と皮（脂肪を含む）の部分を用いて、一般栄養成分分析を行った。また、官能評価項目についても、パネリストを含めた官能評価用語の洗い出しを行い、数値化することで、各地鶏の特徴を明らかにした。また、香氣成分の分析については、臭い嗅ぎ GC (GC-O) を行って、特徴的な香りの同定を試みた。さらに、地鶏の特徴である「歯ごたえ」に着目し、テクスチャーメータを用いた破断にかかる応力の測定を行った。

以下に、各項目について、分析を行った方法と結果を記載する。

<実験方法>

1. 実験材料

今回の試験に供した「東京しゃも」、「名古屋コーチン」、「比内地鶏」、「はかた地どり」のムネ肉ならびにモモ肉は、株式会社 鳥藤より購入した。各地鶏の熟成期間を揃えるため、屠鳥後 3 日目のものを分析用の検体とした。

2. 一般成分分析（水分、脂質、タンパク質、灰分、炭水化物）

各地鶏の一般成分（水分、脂質、タンパク質、灰分、炭水化物）とビタミン B1（チアミン）含量は公益財団法人 日本食品分析センターに分析を依頼し、各々、常法に従って測定を行った。

3. 脂肪酸組成の分析

各地鶏のムネ肉あるいはモモ肉は皮付きのまま、挽肉にした後、Folch 法に準じて、5 倍のクロロホルム/メタノール(2:1)を脂肪に加え、ホモジエネート後、No. 5 定性濾紙でろ液と残渣を分けた。脂質の精製には分配法を用い、上述で得られた全てのろ液を回収したものに 0.2 倍容の水を混和し、3000g で 20 分間遠心分離を行って、クロロホルム層を回収した。クロロホルム層はロータリーエバポレーターを用いて 30~35°C で濃縮し、残水はベンゼンを加えて混合後、溜去した。残留脂質した脂質は「脂肪酸メチル化キット」(ナカラ イテスク)を用いて、メチルエステル化処理を行い、GC で分析を行った。

4. 官能評価法

1) 官能評価用試料の調製方法

- (1) ステンレス製鍋(24cm φ × 12cm)に 3L の水を満たし、IH ヒーターで沸騰するまで加熱した。
- (2) 鶏肉の重量を測定した後、サンプルバック(アズワン: 冷凍・耐湯バック)に入れ、85% vacuum でシールした。袋の内、1 つは温度を測る為、開封したままにした。
- (3) 沸騰状態を維持したまま、サンプルバックごと肉を投入した。一つの鍋に投入するサンプルは 3 検体までとした。開封してある肉の中心温度が 80°C に達したら加熱を終了した。
- (4) 加熱済みのサンプルは加熱損失量の測定後、官能評価用サンプルとして、8 等分し、

一人当たり 2 個ずつ、皮がついたままで提供した（図 1）。



図 1. 官能評価用サンプル

2) 評価方法

基本 5 味（うま味、塩味、酸味、苦味、甘味）について認知閾値で識別ができ、かつ第一産業株式会社の嗅覚トレーニングキットで 5 種類の香気（フェニルエチルアルコール、メチルシクロペンテノロン、イソ吉草酸、ウンデカラクトン、スカトール）を識別出来る人を官能評価のパネリストとした。パネリストには事前に鶏肉を喫食し、味・香り・硬さを評価するトレーニングを週に 1 回のペースで 3 ヶ月に亘り（合計 10 回以上）行った。尚、官能評価項目の決定については、事前にパネリストに東京都武藏境市周辺で購入できるブロイラー や銘柄鶏、地鶏など 5 種類以上の鶏肉検体を喫食して貰い、官能評価項目として採用すべき用語を、「おいしさの官能評価辞典」から抽出して貰った。その結果、表 5 に示す用語が集約されたので、これを官能評価特性用語として、用いることにした。パネリストは各鶏肉を 15 回以上咀嚼して、官能評価特性用語に該当するものがあれば、印を付けて貰った。

表5. 地鶏肉の特徴を探索するために用いた官能評価特性用語

味	香り	香り（続き）
甘味	甘い香り	新鮮な香り
うま味	酸化臭	スモーキーな香り
酸味	鶏らしい香り	焦げた臭い
苦味	苦い香り	タマネギの香り
塩味	ほろ苦い香り	土・泥臭さ
渋味	軽い香り	ツンとくる香り
えぐ味	濃厚な香り	生臭さ
濃い味	重厚な香り	魚臭さ
薄い味	奥深い香り	鼻につく香り
脂っこい味	味わい深い香り	バランスが良い香り
あっさりした味	あっさりした香り	広がりのある香り
しつこい味	さっぱりとした香り	深みのある香り
さっぱりとした味	淡泊な香り	複雑な香り
後をひく	青くさい	ふくよかな香り
キレのある味	アーモンドの香り	ふくらみのある香り
くせのある味	木材の香り	フライドポテトの香り
濃厚な味	バターの香り	フルーティーな香り
厚みのある味	段ボールの香り	フレッシュな香り
血の味	ペンキの香り	芳醇な香り
獣の味	しつこい香り	緑の香り
こくがある	油・脂臭さ	桃の香り
爽やかな味	後をひく香り	テクスチャー
しっかりした味	アンモニア臭	しっとり
繊細な味	磯・海・潮の香り	脂っぽい
淡泊な味	硫黄の香り	水っぽい
上品な味	カビ臭い	なめらか
味わい深い	柑橘系の香り	とろける
香ばしい味	強烈な香り	パサパサ
奥行きのある味	濃縮した香り	堅い(⇒もろい)
土・泥の味	薬臭い	もろい(⇒堅い)
バランスが良い味	くせのある香り	弾力がある
引き締まったく味	血液臭	柔らかい(⇒硬い)
広がりのある味	獣臭	硬い(⇒柔らかい)
複雑な味	濃い香り	ねっとり
優しい味	香ばしい	歯ごたえがある
豊かな味	発酵臭	きめが細かい
まろやかな味	上品な香り	ふんわり
		ほくほく
		まとわりつく

5. 香気成分の分析方法

加熱鶏肉試料は重量比で筋肉と皮が 4:1 となるようにガラス製の密閉容器に入れ、80 °C の湯浴中で 1 時間加温した。ヘッドスペース中に揮発した香気成分は、共に留置した Mono Trap(ジーエルサイエンス)に吸着させた。ジエチルエーテルで脱着させた香気成分は、匂い嗅ぎ GC(GC-0 ; GC-2014、島津)に供して鶏肉の香気の特徴を明らかにすると共に、GC-MS(5975MSD、アジレント)を用いて香気成分の同定を行った。

6. テクスチャーパン

地鶏に特徴的な「歯ごたえ」を評価するため、島津製の小型試験機(EZ-test, E-SX, 500N)を用いて、肉を切断するのに必要な応力の測定を行った。官能評価と同様に加熱調理したムネ肉は、3cm 角となるように裁断し、肉を裁断する治具と筋線維の方向が垂直となるように設置した。また、モモ肉については測定する筋線維の違いによるばらつきが生じないように、筋肉毎に分解し、大臀筋、大腿 2 頭筋、外側広筋を用いて、評価した。

<実験結果および考察>

1. 一般組成とビタミン B1 (チアミン) 含量

(1) ムネ肉

皮付きの地鶏モモ肉の一般組成を表 6 に、また水分とタンパク質、脂質、チアミン量について図 1 と図 2 に示した。昨年度は皮を剥いた筋肉部分のみの分析であったため、今回得られたデータは前回のものと比較すると水分含量と脂質含量が異なっていた。東京しゃもは軍鶏系の血液百分率が 75% であることを反映して、タンパク質含量が高く、脂質が少ない結果であった。同様に軍鶏の系統を引くはかた地どりもタンパク質含量が名古屋コーチンや比内地鶏に比べて 2 割ほど高く、脂質含量が軍鶏系の 1/3~1/4 しか含まれていなかつた。

また、今回は香気への影響を調べるため、各地鶏に含まれるビタミン B1 (チアミン) 含量を測定した。水溶性ビタミンであるチアミンは鶏肉の特徴的な香気成分の 1 つである 2-methyl-3-fraenol の前駆体である。その結果、東京しゃも、比内地鶏、はかた地どりでは 100gあたり 80mg 程度含まれていたのに対し、名古屋コーチンでは 50mg と有意に低い値であった。

表6. 各地鶏のムネ肉（皮を含む）の一般組成並びにチアミン含量

検体名	項目	平均	標準偏差
東京しゃも ムネ	水分 (%)	74.0	0.35
	タンパク質 (%)	23.0	0.10
	脂質 (%)	2.8	0.36
	灰分 (%)	0.9	0.00
	炭水化物 (%)	0.0	0.00
	エネルギー (kcal)	117.0	2.65
	チアミン (g/ 100g)	0.08	0.01
名古屋コーチン ムネ	水分 (%)	70.0	3.01
	タンパク質 (%)	19.6	0.49
	脂質 (%)	10.3	3.03
	灰分 (%)	0.8	0.00
	炭水化物 (%)	0.0	0.00
	エネルギー (kcal)	171.3	25.42
	チアミン (g/ 100g)	0.05	0.01
比内地鶏 ムネ	水分 (%)	66.3	1.70
	タンパク質 (%)	20.9	0.35
	脂質 (%)	12.9	1.82
	灰分 (%)	0.8	0.06
	炭水化物 (%)	0.0	0.00
	エネルギー (kcal)	200.3	16.04
	チアミン (g/ 100g)	0.07	0.01
はかた地どり ムネ	水分 (%)	73.4	0.61
	タンパク質 (%)	23.3	0.17
	脂質 (%)	3.4	0.95
	灰分 (%)	1.0	0.06
	炭水化物 (%)	0.0	0.00
	エネルギー (kcal)	123.3	8.14
	チアミン (g/ 100g)	0.08	0.02




図1. 各地鶏ムネ肉の水分、タンパク質、脂質含量の比較




図2. 各地鶏ムネ肉のチアミン含量の比較

(2) モモ肉

続いて、地鶏モモ肉の一般組成を表7に、また水分とタンパク質、脂質、チアミン量について図3と図4に示した。

表7. 各地鶏のモモ肉（皮を含む）の一般組成並びにチアミン含量

検体名	項目	平均	標準偏差
東京しゃも モモ	水分 (%)	74.8	0.75
	タンパク質 (%)	20.6	0.32
	脂質 (%)	4.3	1.36
	灰分 (%)	0.9	0.00
	炭水化物 (%)	0.0	0.00
	エネルギー (kcal)	121.7	11.59
	チアミン (g/ 100g)	0.10	0.01
名古屋コーチン モモ	水分 (%)	67.4	0.90
	タンパク質 (%)	17.3	0.50
	脂質 (%)	15.3	1.97
	灰分 (%)	0.8	0.00
	炭水化物 (%)	0.0	0.00
	エネルギー (kcal)	207.3	16.17
	チアミン (g/ 100g)	0.09	0.01
比内地鶏 モモ	水分 (%)	64.3	1.43
	タンパク質 (%)	18.4	0.47
	脂質 (%)	17.0	0.70
	灰分 (%)	0.8	0.00
	炭水化物 (%)	0.2	0.35
	エネルギー (kcal)	227.3	7.23
	チアミン (g/ 100g)	0.11	0.02
はかた地どり モモ	水分 (%)	68.0	2.48
	タンパク質 (%)	17.5	0.93
	脂質 (%)	14.1	3.58
	灰分 (%)	0.8	0.00
	炭水化物 (%)	0.0	0.00
	エネルギー (kcal)	196.7	28.36
	チアミン (g/ 100g)	0.10	0.01




図3. 各地鶏モモ肉の水分、タンパク質、脂質含量の比較




図4. 各地鶏モモ肉のチアミン含量の比較

東京しゃものモモ肉はムネ肉と同様にタンパク質含量が 20%程度と高く、脂質含量が 4 %と他の地鶏に比べて 1/4 程度しか含まれていなかった。はかた地どりは軍鶏の血液を

50 %含んでいるが、脂質含量は14 %と名古屋コーチンや比内地鶏と同等の値を示した。水分含量は東京しゃもで75 %と最も多く、これは筋肉量の多さを反映していると推察された。東京しゃもは、歯ごたえが特徴とされている。飼育期間が長いことによる筋線維中のコラーゲンタンパク質の蓄積による硬さの増加の他にも、脂質含量が少なく、タンパク質含量が高いために、脂質による口溶け感が少ないことも影響すると考えられた。チアミン量はムネと異なり、各地鶏で大きな違いは認められず、東京しゃもとはかた地どりで100 gあたり100 mg、比内地鶏で110 mg、名古屋コーチンで90 mgであった。ムネに比べて、モモで検出されるチアミン量は多かった。チアミンが前駆体となる2-methyl-3-franthiolは、構造中に硫黄を配しており、肉様のボディ感（厚み）のある香気を示す。一般的に、モモ肉はムネ肉に比べて濃厚な香りがすると評価されることが多い。チアミン含量と「濃厚さ」や「厚み」を連想させる香気量については、今後さらに検討する必要があると考えられた。

2. 脂肪酸組成

(1) ムネ肉

皮付きの地鶏ムネ肉の脂肪酸組成を表8-1から8-4、ならびに主要な脂肪酸について纏めたものを図5に示した。平成28年度の調査では、皮や脂肪を除いた骨格筋内（筋間）の脂肪を測定したのに対し、今回は皮に付着している皮下脂肪も合わせて測定した。その結果、パルミチン酸、オレイン酸、リノール酸、アラキドン酸などが主要な脂肪酸であることは、筋間脂肪のみの場合も皮下脂肪を含む筋間脂肪の場合も変わらなかった。

脂肪酸として最も多く含まれるオレイン酸は、融点が低い特徴を持ち、牛肉ではオレイン酸含量が霜降り牛肉のおいしさ（口溶け）の指標にされる場合がある。一方で、低い融点は正肉で販売する際に、脂にしまりがなくなり、見た目が悪くなる欠点を有する。名古屋コーチンはオレイン酸含量が44.2 %であり、4品種の中で最も高い値を示した。これに対し、東京しゃもでは、その含量が33.3 %と名古屋コーチンの7割程度の存在量であった。

リノール酸は ω -6系の必須脂肪酸で、オレイン酸やパルミチン酸に次いで含量が多い。東京しゃもや名古屋コーチンでは約20 %の含量であったのに対し、比内地鶏やはかた地どりでは約15 %程度しか含まれていなかつた。リノール酸はトウモロコシに多く含まれており、これを主体とする飼料を摂餌した場合には餌から脂肪酸が移行して、その含量が多くなる。リノール酸は酸化されると青臭い香りを呈するヘキサナールを生じる。後述するが、香気成分分析でも名古屋コーチンからは多くのヘキサナールが検出された。一方、東京しゃももリノール酸量が多いが、脂質自体の量が少ないとため、検出されるヘキサナール量は名古屋コーチンほどではなかつた。

一方、リノール酸から生成されるアラキドン酸は鶏肉の種類によって異なる結果となつた。軍鶏系の東京しゃもやはかた地どりはアラキドン酸量が2.9 %と2.4 %であるのに対し、名古屋コーチンと比内地鶏では、共に0.87 %と1/3程度しか検出されなかつた。尚、アラキドン酸は脂肪酸のリン脂質に多く含まれるため、筋間脂肪のみの場合（平成28年度

実施) では 7.5 % であったが、皮由来の皮下脂肪も合わせて分析した今年の調査では、含量が大きく減少した。

ω -6 系のリノール酸に対し、 ω -3 系の脂肪酸である α リノレン酸は名古屋コーチンで 1.53% と東京しゃもの 2 倍、はかた地どりの 2.7 倍含まれていた。 α リノレン酸から合成されるドコサヘキサエン酸(DHA) は α リノレン酸の含量と相関せず、東京しゃもで 1.43 %、はかた地どりで 0.97 % に対し、名古屋コーチンや比内地鶏では 0.3 % 程度であった。 α リノレン酸から合成される DHA の量は 15 % 程度と考えられていることに加えて、東京しゃもではイコサペンタエン酸(EPA) 含量も多いことから、飼料中に DHA や EPA を含む魚粉が添加されていると推察された。

表 8-1. 東京しゃものムネ肉(皮を含む)の脂肪酸組成

検体名	脂肪酸		平均 (%)	標準偏差
東京しゃもムネ	12 : 0	ラウリン酸	0.00	0.00
	14 : 0	ミスチリン酸	0.83	0.05
	14 : 1	ミリストレイン酸	0.07	0.05
	15 : 0	ペントデシル酸	0.10	0.00
	16 : 0	パルミチン酸	23.40	0.45
	16 : 1	パルミトレイン酸	3.00	0.50
	17 : 0	ヘプタデカン酸	0.20	0.00
	18 : 0	ステアリン酸	10.07	0.87
	18 : 1	オレイン酸	33.37	0.76
	18 : 2n-6	リノール酸	19.03	0.88
	18 : 3n-6	γ リノレン酸	0.13	0.05
	18 : 3n-3	α リノレン酸	0.73	0.05
	20 : 0	アラキジン酸	0.13	0.05
	20 : 1	イコセン酸	0.63	0.05
	20 : 2n-6	イコサジエン酸	0.23	0.05
	20 : 3n-6	イコサトリエン酸	0.30	0.00
	20 : 4n-6	アラキドン酸	2.87	0.38
	20 : 5n-3	イコサペンタエン酸	0.17	0.05
	22 : 4n-6	ドコサテトラエン酸	0.40	0.08
	22 : 5n-6	ドコサペンタエン酸	0.03	0.05
	22 : 5n-3	ドコサヘキサエン酸	0.47	0.09
	22 : 6n-3	ドコサヘキサエン酸	1.43	0.05
	未同定		2.30	0.14

表8-2. 名古屋コーチンのムネ肉（皮を含む）の脂肪酸組成

検体名	脂肪酸		平均 (%)	標準偏差
名古屋コーチンムネ	12 : 0	ラウリン酸	0.10	0.00
	14 : 0	ミスチリン酸	0.80	0.00
	14 : 1	ミリストレイン酸	0.17	0.05
	15 : 0	ペントデシル酸	0.10	0.00
	16 : 0	パルミチン酸	20.47	0.62
	16 : 1	パルミトレイン酸	3.57	1.04
	17 : 0	ヘプタデカン酸	0.23	0.05
	18 : 0	ステアリン酸	5.77	0.52
	18 : 1	オレイン酸	44.23	0.52
	18 : 2n-6	リノール酸	19.43	1.07
	18 : 3n-6	γリノレン酸	0.00	0.00
	18 : 3n-3	αリノレン酸	1.53	0.05
	20 : 0	アラキジン酸	0.03	0.05
	20 : 1	イコセン酸	0.43	0.05
	20 : 2n-6	イコサジエン酸	0.10	0.00
	20 : 3n-6	イコサトリエン酸	0.10	0.00
	20 : 4n-6	アラキドン酸	0.87	0.24
	20 : 5n-3	イコサペンタエン酸	0.00	0.00
	22 : 4n-6	ドコサテトラエン酸	0.13	0.05
	22 : 5n-6	ドコサペンタエン酸	0.00	0.00
	22 : 5n-3	ドコサヘキサエン酸	0.13	0.05
	22 : 6n-3	ドコサヘキサエン酸	0.30	0.08
	未同定		1.37	0.24

表8-3. 比内地鶏のムネ肉(皮を含む)の脂肪酸組成

検体名	脂肪酸		平均 (%)	標準偏差
比内地鶏ムネ	12 : 0	ラウリン酸	0.00	0.00
	14 : 0	ミスチリン酸	0.60	0.00
	14 : 1	ミリストレイン酸	0.10	0.00
	15 : 0	ペンタデシル酸	0.00	0.00
	16 : 0	パルミチン酸	23.53	0.69
	16 : 1	パルミトレイン酸	4.43	0.62
	17 : 0	ヘプタデカン酸	0.20	0.00
	18 : 0	ステアリン酸	6.50	0.29
	18 : 1	オレイン酸	42.23	1.59
	18 : 2n-6	リノール酸	15.47	5.50
	18 : 3n-6	γリノレン酸	0.00	0.00
	18 : 3n-3	αリノレン酸	0.87	0.05
	20 : 0	アラキジン酸	0.00	0.00
	20 : 1	イコセノン酸	0.33	0.05
	20 : 2n-6	イコサジエン酸	0.03	0.05
	20 : 3n-6	イコサトリエン酸	0.10	0.00
	20 : 4n-6	アラキドン酸	0.87	0.12
	20 : 5n-3	イコサペントエン酸	0.00	0.00
	22 : 4n-6	ドコサテトラエン酸	0.03	0.05
	22 : 5n-6	ドコサペントエン酸	0.00	0.00
	22 : 5n-3	ドコサヘキサエン酸	0.00	0.00
	22 : 6n-3	ドコサヘキサエン酸	0.27	0.05
	未同定		1.10	0.08

表8-4. はかた地どりのムネ肉(皮を含む)の脂肪酸組成

検体名	脂肪酸		平均 (%)	標準偏差
はかた地どりムネ	12 : 0	ラウリン酸	0.00	0.00
	14 : 0	ミスチリン酸	0.93	0.09
	14 : 1	ミリストレイン酸	0.20	0.00
	15 : 0	ペンタデシル酸	0.10	0.00
	16 : 0	パルミチン酸	22.50	1.22
	16 : 1	パルミトレイン酸	4.17	0.56
	17 : 0	ヘプタデカン酸	0.23	0.05
	18 : 0	ステアリン酸	7.77	0.52
	18 : 1	オレイン酸	41.13	0.59
	18 : 2n-6	リノール酸	13.97	0.12
	18 : 3n-6	γリノレン酸	0.17	0.05
	18 : 3n-3	αリノレン酸	0.57	0.05
	20 : 0	アラキジン酸	0.00	0.00
	20 : 1	イコセン酸	0.53	0.05
	20 : 2n-6	イコサジエン酸	0.20	0.00
	20 : 3n-6	イコサトリエン酸	0.33	0.05
	20 : 4n-6	アラキドン酸	2.43	0.97
	20 : 5n-3	イコサペンタエン酸	0.07	0.05
	22 : 4n-6	ドコサテトラエン酸	0.37	0.09
	22 : 5n-6	ドコサペンタエン酸	0.07	0.09
	22 : 5n-3	ドコサペンタエン酸	0.50	0.14
	22 : 6n-3	ドコサヘキサエン酸	0.97	0.25
	未同定		2.77	0.59




図5. 各地鶏のムネ肉に含まれる主要な脂肪酸含量の比較

(2) モモ肉

次に、皮付きの地鶏ムネ肉の脂肪酸組成を表9-1から9-4、ならびに主要な脂肪酸について纏めたものを図6に示した。モモ肉の脂肪酸組成の特徴はムネ肉とほぼ同じであった。各地鶏の脂肪酸組成の特徴を纏めると、東京しゃもでは、オレイン酸含量が低く、アラキドン酸含量とDHA含量EPA含量が高いのに対し、名古屋コーチンでは、オレイン酸含量が高く、アラキドン酸やDHA含量は低い結果であった。この傾向は、比内地鶏でも同様であった。一方、はかた地どりのムネではDHAやEPAが多く検出されたが、モモではDHA含量が低く、名古屋コーチンや比内地鶏と同程度の0.2%程度であった。EPAにいたっては検出されなかった。

表9-1. 東京しゃものモモ肉(皮を含む)の脂肪酸組成

検体名	脂肪酸組成		平均 (%)	標準偏差
東京しゃもモモ	12:0	ラウリン酸	0.00	0.00
	14:0	ミスチリン酸	0.80	0.00
	14:1	ミリストレイン酸	0.13	0.05
	15:0	ペンタデシル酸	0.10	0.00
	16:0	パルミチン酸	23.63	1.39
	16:1	パルミトレイン酸	3.87	0.87
	17:0	ヘプタデカン酸	0.20	0.00
	18:0	ステアリン酸	10.07	1.05
	18:1	オレイン酸	32.53	0.82
	18:2n-6	リノール酸	18.93	0.12
	18:3n-6	γリノレン酸	0.17	0.05
	18:3n-3	αリノレン酸	0.73	0.05
	20:0	アラキジン酸	0.13	0.05
	20:1	イコセン酸	0.60	0.00
	20:2n-6	イコサジエン酸	0.20	0.00
	20:3n-6	イコサトリエン酸	0.37	0.05
	20:4n-6	アラキドン酸	2.87	0.77
	20:5n-3	イコサペンタエン酸	0.17	0.05
	22:4n-6	ドコサテトラエン酸	0.43	0.09
	22:5n-6	ドコサペンタエン酸	0.07	0.05
	22:5n-3	ドコサペンタエン酸	0.53	0.09
	22:6n-3	ドコサヘキサエン酸	1.23	0.31
	未同定		2.10	0.50

表9-2. 名古屋コーチンのモモ肉（皮を含む）の脂肪酸組成

検体名	脂肪酸組成		平均 (%)	標準偏差
名古屋コーチンモモ	12 : 0	ラウリン酸	0.1	0.05
	14 : 0	ミスチリン酸	0.8	0.00
	14 : 1	ミリストレイン酸	0.2	0.00
	15 : 0	ペントデシル酸	0.1	0.00
	16 : 0	パルミチニ酸	20.3	0.52
	16 : 1	パルミトレイン酸	4.2	1.03
	17 : 0	ヘプタデカン酸	0.2	0.00
	18 : 0	ステアリン酸	5.3	0.31
	18 : 1	オレイン酸	44.3	0.60
	18 : 2n-6	リノール酸	19.6	1.28
	18 : 3n-6	γリノレン酸	0.0	0.00
	18 : 3n-3	αリノレン酸	1.6	0.12
	20 : 0	アラキジン酸	0.0	0.05
	20 : 1	イコセン酸	0.5	0.05
	20 : 2n-6	イコサジエン酸	0.1	0.05
	20 : 3n-6	イコサトリエン酸	0.1	0.00
	20 : 4n-6	アラキドン酸	0.8	0.08
	20 : 5n-3	イコサペンタエン酸	0.0	0.00
	22 : 4n-6	ドコサテトラエン酸	0.1	0.00
	22 : 5n-6	ドコサペンタエン酸	0.0	0.00
	22 : 5n-3	ドコサペンタエン酸	0.1	0.00
	22 : 6n-3	ドコサヘキサエン酸	0.2	0.05
	未同定		1.2	0.09

表9-3. 比内地鶏のモモ肉(皮を含む)の脂肪酸組成

検体名	脂肪酸組成		平均 (%)	標準偏差
比内地鶏モモ	12 : 0	ラウリン酸	0.00	0.00
	14 : 0	ミスチリン酸	0.63	0.05
	14 : 1	ミリストレイン酸	0.10	0.00
	15 : 0	ペンタデシル酸	0.00	0.00
	16 : 0	ハキニチン酸	22.93	0.68
	16 : 1	パルミトレイン酸	3.77	0.19
	17 : 0	ヘプタデカン酸	0.20	0.00
	18 : 0	ステアリン酸	6.93	0.75
	18 : 1	オレイン酸	40.60	0.16
	18 : 2n-6	リノール酸	21.07	1.39
	18 : 3n-6	γリノレン酸	0.00	0.00
	18 : 3n-3	αリノレン酸	0.83	0.05
	20 : 0	アラキジン酸	0.00	0.00
	20 : 1	イコセン酸	0.33	0.05
	20 : 2n-6	イコサジエン酸	0.10	0.00
	20 : 3n-6	イコサトリエン酸	0.13	0.05
	20 : 4n-6	アラキドン酸	0.87	0.05
	20 : 5n-3	イコサペントエン酸	0.00	0.00
	22 : 4n-6	ドコサテトラエン酸	0.20	0.00
	22 : 5n-6	ドコサペントエン酸	0.00	0.00
	22 : 5n-3	ドコサヘキサエン酸	0.00	0.00
	22 : 6n-3	ドコサヘキサエン酸	0.20	0.00
	未同定		1.03	0.09

表9-4. はかた地どりのモモ肉（皮を含む）の脂肪酸組成

検体名	脂肪酸組成		平均 (%)	標準偏差
はかた地どりモモ	12 : 0	ラウリン酸	0.00	0.00
	14 : 0	ミスチリン酸	0.93	0.05
	14 : 1	ミリストレイン酸	0.23	0.05
	15 : 0	ペンタデシル酸	0.10	0.00
	16 : 0	パルミチン酸	24.33	1.33
	16 : 1	パルミトレイン酸	6.00	1.56
	17 : 0	ヘプタデカン酸	0.20	0.00
	18 : 0	ステアリン酸	6.77	0.78
	18 : 1	オレイン酸	44.37	0.24
	18 : 2n-6	リノール酸	12.87	1.32
	18 : 3n-6	γリノレン酸	0.00	0.00
	18 : 3n-3	αリノレン酸	0.60	0.08
	20 : 0	アラキジン酸	0.00	0.00
	20 : 1	イコセン酸	0.50	0.08
	20 : 2n-6	イコサジエン酸	0.13	0.05
	20 : 3n-6	イコサトリエン酸	0.20	0.00
	20 : 4n-6	アラキドン酸	0.77	0.25
	20 : 5n-3	イコサペンタエン酸	0.00	0.00
	22 : 4n-6	ドコサテトラエン酸	0.13	0.05
	22 : 5n-6	ドコサペンタエン酸	0.00	0.00
	22 : 5n-3	ドコサヘキサエン酸	0.13	0.05
	22 : 6n-3	ドコサヘキサエン酸	0.23	0.05
	未同定		1.43	0.21




図6. 各地鶏のモモ肉に含まれる主要な脂肪酸含量の比較

3. 地鶏の食味性の違い

地鶏の肉は、一般的に、歯ごたえがあり、味わいが深いという特徴を有すると言われている。しかし、この食味性の特徴を、系統的にかつ科学的な実験で解析した研究はほとんどないのが現状である。昨年度は地鶏の食味性について、プロイラーの肉を対照として、地鶏を喫食した際に検知される味、香り、食感について、こちらが予め用意した官能評価シートに記載されている官能評価用語（味；37項目、香り；69項目、テクスチャー；14項目）の強度を3段階の評点法で評価した。今年度は、地鶏の食味性の違いを更に繊細に検知するため、パネリストには3ヶ月に亘る鶏肉の官能評価に関するトレーニングを受けた者に協力して貰い、官能評価用語についても、パネリストが今回の評価対象以外の地鶏や銘柄鶏、プロイラーを喫食した際に、評価可能と判断された特定官能評価用語を用いた。また、評価方法も1点の鶏肉を喫食した際に、特定官能評価用語が検知されれば、チェックを入れ、その数の多さ（検知した人数）で評価した。尚、地鶏の種類によって、パネリストの人数が異なるため、チェック数をパネリストの数で除した数値を記載した。特に、半数以上のパネリストが検知した項目については、表中に色を配した。

(1) ムネ肉

始めに、各地鶏のムネ肉の味に関する結果を表10に示す。うま味は何れの地鶏でも半数以上のパネリストが検知したが、特に東京しゃもと比内地鶏では、うま味が有意に強いと判断された。また、名古屋コーチンでは「あっさりした味」(味強度が持続しない)、はかた地どりでは、「酸味」が有意に強いとされた。

平成28年度に実施した各地鶏のムネ肉に含まれるうま味物質の比較では、東京しゃものグルタミン酸が2.0 mM、イノシン酸が3.7 mM、名古屋コーチンではグルタミン酸が1.5 mM、イノシン酸が2.4 mM、比内地鶏ではグルタミン酸が2.2 mM、イノシン酸が2.0 mM、はかた地どりではグルタミン酸が1.5 mM、イノシン酸が5.6 mMであった。

うま味は、グルタミン酸とイノシン酸がモル比1:2で存在するときに最もうま味を強く感じ、その値は各うま味成分が単独で存在するときの7倍に相当すると報告されている。

今回、各地鶏ムネ肉のうま味の比率を表11に纏めたところ、東京しゃもでは、この「うま味の相乗効果」が得られる比率に最も近いことが明らかとなった。これは、官能評価の結果と一致していた。

表10. 各地鶏ムネ肉の官能評価の比較(風味)

味	東京しゃも	名古屋コーチン	比内地鶏	はかた地どり
	n=13	n=11	n=12	n=12
甘味	0.38	0.18	0.25	0.25
うま味	0.85	0.64	0.75	0.58
酸味	0.54	0.64	0.58	0.75
苦味	0.08			
塩味			0.08	0.08
えぐ味	0.08		0.08	
濃い味	0.31	0.09	0.25	0.17
薄い味	0.38	0.27	0.25	0.42
脂っこい味	0.15	0.18	0.25	0.17
あっさりした味	0.46	0.82	0.67	0.67
しつこい味				0.08
さっぱりとした味	0.15	0.45	0.58	0.33
後をひく	0.23	0.09	0.08	0.08
キレのある味				
くせのある味	0.23	0.09	0.08	0.08
濃厚な味	0.15	0.09		
厚みのある味	0.15		0.17	
血の味	0.08		0.17	
獣の味				0.08
こくがある	0.31	0.18	0.08	
しっかりした味	0.23		0.17	0.25
繊細な味		0.18	0.08	
淡泊な味	0.54	0.45	0.67	0.58
上品な味		0.09	0.08	
味わい深い	0.15		0.17	0.17
香ばしい味	0.08		0.17	
奥行きのある味	0.08	0.18	0.08	
バランスが良い味	0.15	0.09	0.08	
引き締まった味		0.09		
広がりのある味	0.23	0.18	0.08	
複雑な味	0.15	0.09	0.17	0.25
優しい味	0.15	0.27	0.42	0.25
豊かな味	0.23	0.09	0.08	
まろやかな味		0.18	0.25	0.08

nの後に記載された数字はパネリストの人数を指す。

表11. 各地鶏のムネ肉に含まれるグルタミン酸とイノシン酸の比率

品種	比率（グルタミン酸を1とした場合）
東京しゃも	1 : 1.85
名古屋コーチン	1 : 1.56
比内地鶏	1 : 0.92
はかた地どり	1 : 3.78

次に、香りについて調べた結果を表12に示す。東京しゃも、名古屋コーチン、比内地鶏の喫食で、半数以上のパネリストが甘さを連想させる香りを検知した。当然のことながら、鶏らしい香りは全ての品種で検知されており、特に比内地鶏では全員が回答した。これまでの研究結果から、鶏らしい香りの構成要素として、2,4-decadienal、1-octen-3-ol、2-methyl-3-franthyolなどが報告されている。後述するが、比内地鶏では2,4-decadienal量が最も多く、パネリストはこの香りを鋭敏に検知していたと考えられた。他に、比内地鶏の特徴として、淡泊な香りであると評された。香りは種々の揮発性香気成分で成り立っている。後残りする香気成分（ラストノートの強い香気成分；嗅覚細胞の刺激が持続する香り）量が少ない場合や、インパクトの強い（特異な香りや、少量で香りを強く感じる化合物）香気成分が突出していないことに起因すると推察された。

この他に名古屋コーチンはバターの香りがすると評価された。バターの香気成分は十分に検討されていないが、酪酸やラクトン類、ジアセチルがその香気形成に寄与している。今回、名古屋コーチンのムネ肉からは、チーズの香りである Heptanoic acid が多く検出された。しかし、ラクトン類が今回は殆ど検出されなかつたため、さらなる分析方法を試みる必要があると考えられた。

表12. 各地鶏ムネ肉の官能評価の比較（香り）

香り	東京しやも	名古屋コーチン	比内地鶏	はかた地どり
	n=13	n=11	n=12	n=12
甘い香り	0.54	0.55	0.58	0.42
酸化臭	0.46	0.45	0.17	0.25
鶏らしい香り	0.77	0.82	1	0.67
ほろ苦い香り	0.08		0.08	0.08
軽い香り	0.15	0.18	0.17	0.25
濃厚な香り	0.08	0.18	0.08	0.17
重厚な香り	0.23	0.09	0.08	
奥深い香り	0.08	0.09	0.17	
味わい深い香り	0.08	0.18	0.17	0.25
あっさりした香り	0.23	0.36	0.33	0.5
さっぱりとした香り	0.31	0.18	0.42	0.25
淡泊な香り	0.15	0.36	0.67	0.33
青くさい	0.15	0.09		0.08
アーモンドの香り	0.15	0.09	0.17	0.17
木材の香り	0.31	0.09	0.17	0.25
バターの香り	0.15	0.55	0.25	0.17
段ボールの香り	0.31	0.27	0.25	0.17
ペンキの香り	0.08			
油・脂臭さ	0.15	0.45	0.17	0.17
後をひく香り	0.15	0.09		0.08
磯・海・潮の香り	0.08	0.18		
濃縮した香り	0.08			
くせのある香り	0.15	0.09	0.08	0.17
血液臭			0.17	0.25
獣臭	0.08		0.08	0.08
香ばしい			0.25	0.17
発酵臭		0.09		
上品な香り	0.08	0.09	0.17	0.08
新鮮な香り		0.09		
スマーキーな香り	0.08		0.08	0.08
土・泥臭さ			0.08	0.08
生臭さ				0.08
魚臭さ		0.09		0.17
鼻につく香り				0.08
バランスが良い香り	0.15	0.27	0.08	0.08
広がりのある香り	0.15	0.36	0.33	0.17
深みのある香り	0.15	0.09	0.17	
複雑な香り	0.23	0.09	0.25	0.17
ふくよかな香り		0.09	0.25	
ふくらみのある香り			0.08	
フライドポテトの香	0.08	0.18		
フルーティーな香り				0.08
フレッシュな香り	0.08		0.08	
芳醇な香り	0.08	0.18	0.08	0.17
緑の香り				
桃の香り	0.08		0.08	0.08

続いて、食感（テクスチャー）に関して調べた結果を表 13 に示す。

名古屋コーチンは、水っぽいとされた。名古屋コーチンの水分含量は 70% と決して多い訳ではなかった。一方、東京しゃも、比内地鶏、はかた地どりは「ぱさぱさ」の食感と評価されたのに対し、名古屋コーチンでは「ぱさぱさ」感を検知したパネリストは少なかった。今回、調理時にクッキングロスを測定していなかったため、次回は保水性を調べる必要があると考えられた。また、東京しゃもと比内地鶏では弾力と歯ごたえがあると評価された。

表 13. 各地鶏ムネ肉の官能評価の比較（食感）

食感	東京しゃも n=13	名古屋コーチン n=11	比内地鶏 n=12	はかた地どり
				n=12
しっとり	0.46	0.27	0.42	0.33
脂っぽい	0.15	0.18	0.25	0.17
水っぽい	0.38	0.73	0.25	0.5
なめらか	0.08	0.18	0.08	
とろける		0.09	0	
パサパサ	0.54	0.27	0.83	0.83
堅い(⇒もろい)	0.31	0	0.25	0.33
もろい(⇒堅い)	0.08	0.18	0.08	0.25
弾力がある	0.54	0.36	0.67	0.25
柔らかい(⇒硬い)	0.38	0.45	0.17	0.33
硬い(⇒柔らかい)	0.08	0.09	0.25	0.17
ねっとり	0	0.09	0.33	0.08
歯ごたえがある	0.62	0.18	0.58	0.25
きめが細かい	0.38	0.09	0.17	0.25
ふんわり	0.31	0.36	0.25	0.08
ほくほく	0.15	0.09	0.17	0
まとわりつく	0.15	0.09	0.08	0.08

(2) モモ肉

次に、各地鶏のモモ肉の味に関する官能評価の結果を表 14 に示す。4 品種に共通しているのは、「うま味」と「脂っこい味」であった。この他、名古屋コーチンでは「濃い味」、比内地鶏では「こくがある」と評価された。ムネ肉と同様に平成 28 年度に実施した各地鶏のモモ肉に含まれるうま味物質の比較では、東京しゃものグルタミン酸が 3.1 mM、イノシン酸が 4.5 mM、名古屋コーチンではグルタミン酸が 2.8 mM、イノシン酸が 2.1 mM、比内地鶏ではグルタミン酸が 2.8 mM、イノシン酸が 1.8 mM、はかた地どりではグルタミン酸が 4.7 mM、イノシン酸が 5.3 mM であった。

グルタミン酸とイノシン酸のモル比を同様に比較したところ、表 15 に示す通り、東京しゃも黄金比の 1:2 の存在比に最も近く、うま味物質の比率が 1:0.65 とバランスの悪い比内地鶏の場合には、うま味の検知人数が最も少くなってしまっており、官能評価の結果とよく相関していた。

表14. 各地鶏モモ肉の官能評価の比較（風味）

味	東京しやも	名古屋コーチン	比内地鶏	はかた地どり
	n=12	n=10	n=12	n=12
甘味	0.42	0.5	0.25	0.33
うま味	1	1	0.75	1
酸味	0.17	0.1	0.08	0.25
苦味		0.1	0.08	
塩味	0.08	0.2	0.33	0.25
渋味			0.08	
えぐ味	0.08	0.2	0.17	0.08
濃い味	0.17	0.5	0.33	0.33
薄い味	0.17	0.1		
脂っこい味	0.5	0.6	0.67	0.58
あっさりした味	0.25	0.2	0.08	
しつこい味		0.1	0.17	0.17
さっぱりとした味	0.17	0.1	0.08	0.17
後をひく	0.08	0.2	0.42	0.17
キレのある味			0.17	
くせのある味	0.25	0.2	0.25	0.25
濃厚な味	0.17	0.3	0.42	0.25
厚みのある味	0.25	0.2	0.33	0.08
血の味	0.08	0.3	0.08	0.17
獣の味	0.17	0.1	0.25	0.08
こくがある	0.33	0.3	0.5	0.25
しっかりした味	0.42	0.1	0.33	0.25
纖細な味	0.25			
淡泊な味	0.25			0.17
上品な味		0.3		0.08
味わい深い	0.33	0.2	0.33	0.33
香ばしい味	0.17	0.3	0.42	0.17
奥行きのある味		0.2	0.17	0.17
土・泥の味			0.08	0.08
バランスが良い味	0.17	0.1	0.17	0.17
引き締まったく味	0.17			
広がりのある味	0.17	0.3	0.25	0.25
複雑な味	0.17	0.3	0.33	0.33
優しい味	0.08	0.2	0.08	0.17
豊かな味	0.25	0.1	0.33	0.08
まろやかな味	0.17		0.17	0.17

表15. 各地鶏のモモ肉に含まれるグルタミン酸とイノシン酸の比率

品種	比率（グルタミン酸を1とした場合）
東京しやも	1 : 1.45
名古屋コーチン	1 : 0.75
比内地鶏	1 : 0.65
はかた地どり	1 : 0.89

続いて、各地鶏の香りに関する官能評価の結果を表16に示す。甘さを連想する香り、鶏らしい香りは4品種に共通して検知された。特に、甘い香りは名古屋コーチンで検知する人数が多かった。これ以外に地鶏ごとに特徴を挙げると、東京しやもでは濃厚な香りがし、名古屋コーチンではムネ肉に統いて、バターの香りが検知された。比内地鶏では脂くささや香ばしいと評価された。また、パネリストの4割が濃厚な香りや、深みのある香りおよび重厚な香りと評価しており、これは脂質由来の濃厚な香りが寄与していると考えられた。はかた地どりでは半数のパネリストが濃厚な香りがあると評価した。比内地鶏と同様に脂臭さがあり、他にくせのある特有の香りも検知された。

表 16. 各地鶏モモ肉の官能評価の比較（香り）

香り	東京しゃも	名古屋コーチン	比内地鶏	はかた地どり
	n=12	n=10	n=12	n=12
甘い香り	0.58	0.7	0.58	0.67
酸化臭	0.08	0.2	0.17	0.33
鶏らしい香り	1	1	0.92	0.83
ほろ苦い香り	0.17	0.2		0.08
軽い香り				0.08
濃厚な香り	0.5	0.3	0.42	0.5
重厚な香り	0.25	0.4	0.42	0.17
奥深い香り	0.33	0.3	0.17	0.08
味わい深い香り	0.25	0.2	0.33	0.33
あっさりした香り	0.08	0.2	0.33	0.08
さっぱりとした香り	0.17	0.1		
淡泊な香り	0.08		0.08	0.08
青くさい	0.08	0.1		0.08
アーモンドの香り	0.33	0.1	0.25	0.17
木材の香り	0.17	0.1	0.08	0.17
バターの香り	0.42	0.5	0.33	0.25
段ボールの香り		0.2	0.17	0.25
ペンキの香り	0.08			
しつこい香り		0.1	0.08	0.17
油・脂臭さ	0.25	0.3	0.67	0.5
後をひく香り	0.17		0.25	
磯・海・潮の香り	0.08	0.1	0.17	0.08
濃縮した香り	0.25	0.2	0.08	
薬臭い			0.08	
くせのある香り	0.17	0.1	0.17	0.5
血液臭		0.2	0.25	
獣臭	0.17	0.2	0.25	0.25
濃い香り	0.08	0.2	0.17	0.17
香ばしい	0.25	0.2	0.5	0.33
上品な香り				0.08
スマーキーな香り	0.17	0.1	0.08	0.08
タマネギの香り			0.08	0.17
土・泥臭さ	0.08			
生臭さ			0.17	0.08
魚臭さ	0.08			0.08
鼻につく香り		0.1		
バランスが良い香り	0.17	0.1	0.08	
広がりのある香り	0.17	0.1	0.33	0.08
深みのある香り	0.33	0.2	0.42	0.33
複雑な香り	0.25	0.3	0.25	0.25
ふくよかな香り			0.25	0.08
ふくらみのある香り	0.08	0.1	0.25	
フライドポテトの香り		0.1	0.08	
芳醇な香り	0.08	0.2	0.08	0.17
桃の香り			0.08	0.17

最後に、各地鶏の食感に関する官能評価の結果を表 17 に示す。

4 品種に共通する項目として「脂っぽい」が挙げられた。また、地鶏の特徴である弾力ははかた地どり以外で検知されたが、歯ごたえがあると評価されたのは比内地鶏だけであった。弾力と歯ごたえの違いであるが、弾力は噛み切る時の前歯での感覚、歯ごたえは奥歯で咀嚼した際に必要となる力を指す。一方、柔らかいとは、筋線維のほぐれやすさが影響していると考えられた。

表 17. 各地鶏モモ肉の官能評価の比較（食感）

食感	東京しゃも	名古屋コーチン	比内地鶏	はかた地どり
	n=12	n=10	n=12	n=12
しっとり	0.83	0.3	0.25	0.17
脂っぽい	0.58	0.7	0.83	0.83
水っぽい	0.08	0.6	0.08	0.08
なめらか	0.17	0.4	0.17	0.42
とろける	0.08	0.1	0.08	0.08
パサパサ			0.17	0.08
堅い(⇒もろい)	0.17		0.17	0.17
もろい(⇒堅い)	0.17		0.08	
弾力がある	0.67	0.6	0.92	0.42
柔らかい(⇒硬い)	0.67	0.6	0.25	0.67
硬い(⇒柔らかい)	0.17	0.3	0.42	0.08
ねっとり	0.17	0.3	0.08	0.08
歯ごたえがある	0.42	0.4	0.75	0.25
きめが細かい	0.17	0.1	0.17	0.17
ふんわり	0.33	0.2	0.25	0.33
ほくほく	0.33	0.1	0.17	0.25
まとわりつく	0.08			

4. GC-O と GC-MS を用いた鶏肉香気成分の比較と物質の同定

官能評価の特徴を科学的に証明するため、まずは、香気成分のパターンをガスクロマトグラフィーと臭い嗅ぎ GC (GC-O) で分析し、それぞれを比較した。

1) 香気成分パターンの違い

4 品種の地鶏のムネ肉とモモ肉から捕集した香気成分のガスクロマトグラムを図 7-1 と図 7-2、ならびに図 8-1 と図 8-2 に示す。鶏肉に特徴的な香気成分であるヘキサンアル (Hexanal) やオクテナール (Octenal)、ノナナール (Nonanal)、2, 4-デカジエナール (2, 4-decadienal)、1-オクテン-3-オール (1-Octen-3-ol) などは何れの鶏肉からも検出された。クロマトグラムの揮発性化合物量を見ると、東京しゃもでは、9 分から 14 分にかけてカラムから脱着される成分量が少ないのでに対し、他の 3 品種（名古屋コーチン、比内地鶏、はかた地どり）では多くのピークが認められた。また、リノール酸の脂質過酸化に

よって生じるヘキサナール量にも違いがあり、名古屋コーチンでは、その量が 1.4 倍ほど認められた。これは前述の脂肪酸組成の結果ともよく一致していた。




図 7-1. GC/MS を用いた東京しゃもと名古屋コーチンのムネ肉のクロマトグラムと検出された化合物の比較





図 7－2. GC/MS を用いた比内地鶏とはかた地どりのムネ肉のクロマトグラムと検出された化合物の比較




図8－2. GC/MS を用いた比内地鶏とはかた地どりのモモ肉のクロマトグラムと検出された化合物の比較

続いて、表18に、鶏肉の香気成分をGC-Oによって分析した結果を示す。GC-OはGCで各揮発性成分に単離された化合物をヒトの嗅覚を用いて、香りの特徴を明らかにする分析法を指す。その結果、何れの鶏肉（ムネ・モモ共に）からも同様の香気の特徴が得られ、その強度が異なることが明らかとなった。




図 8-1. GC/MS を用いた東京しやもと名古屋コーチンのモモ肉のクロマトグラムと検出された化合物の比較

表18. GC-O を用いて鶏肉から検知された香気の特徴

検知時間	香りの特徴
8.0 - 9.2	青臭い
9.4	ニンニク、キムチ、硫黄化合物
10.5	キノコ
11.4	磯の臭い
11.7	蒸した米、甘い
12.8	発酵臭
13.8	パクチー
14.3	トマト、甘い
14.8	カメムシ、ぬか漬け
15.4	青い香り
15.8	フローラル、甘い
15 - 16.8	香ばしい
16.8	甘いポップコーン
18.0	脂肪、ベーコン
18.5	脂肪、ベーコン
19.4	キノコ、脂肪

GC-O と GC/MS を対応させると、8 分の青臭い香りは Hexanal、9.4 分のニンニク、キムチ、硫黄化合物は Methyl Ethyl sulfide、11.4 分の磯の香りは Diethyl sulfide、11.7 分の蒸した米は Acetophenone、13.8 分のパクチーは Octanal（オクタナールの標品はオレンジの香り）、14.3 分のトマトは酢酸、14.8 分のカメムシ、ぬか漬けは Nonanal、15.4 分の青い香りは 2-Ethyl-hexanol、15.8 分のフローラル、甘い香りは Benzaldehyde（ベンズアルデヒドの標品はアーモンド様の甘い香り）、16.8 分の甘いポップコーンは Diethyl sulfoxide、18 分の脂肪、ベーコンの香りは 2-Decenal、18.5 分の脂肪、ベーコンの香り Heptanoic acid は（ヘプタン酸の標品はチーズや銀杏の香り）、19.4 分のキノコ、脂肪の香りは 2,4-decadienal（2,4-decadienal の標品はカメムシの香り）と、GC-O の化合物と GC-MS で同定された成分はほぼ一致した。一方で、15 分から 16 分にかけての細かいピーク（香ばしい香りに対応）は物質の同定に至らなかった。

官能評価の結果と対応させると、各品種で検知された甘い香りは Benzaldehyde および 2-Ethyl hexanol であると考えられた。また、名古屋コーチンのムネ肉ならびにモモ肉で特徴付けられたバターの香りはチーズや乳製品様の香りである Heptanoic acid の可能性が考えられ、名古屋コーチンから検出された同化合物量を比較しても、検出された量が多くかった。他にも、比内地鶏、はかた地どりのモモ肉で検知された脂くさい香りは、グレー

ビーソース様と評される 2-Decenal が影響している可能性が示唆された。比内地鶏の香ばしい香りは、Diethyl sulfoxide 量を他の品種と比較しても決して多くはなく、15-16.8 分にかけて検知される香ばしい香氣成分をさらに調べる必要があると考えられた。

5. 地鶏の硬さの評価

最後に、地鶏の特徴の一つである「歯ごたえ」について、破断応力による客観的評価を試みた。




図9. 各地鶏ムネ肉の剪断にかかる力の比較 (n=4)

その結果、図9に示すように、地鶏によって硬さに違いが認められ、剪断に関わる力は東京しゃも、比内地鶏では強く（平均60N）、比内地鶏やはかた地どりでは前出の半分程度の力（平均30N）が必要であることが判った。この結果は、官能評価とよく相關していた。

次に、モモ肉についても同様に調べた。モモ肉は多種の筋肉が存在しており、これまでに硬さを評価した報告は1例を除いてなされていない。今回、地鶏の特徴であるモモ肉の歯ごたえを評価するために、解剖学的に筋肉毎に分けて、その破断に関わる応力を測定した。




図10. 比内地鶏のモモ肉を由来とする筋肉の剪断にかかる力の比較（n=2）

比内地鶏の大臀筋、大腿二頭筋、外側広筋の3つの筋肉を用い、それぞれの筋肉を測定したところ、ばらつきが少なく再現性のあるデータが得られた。今回は予備的に比内地鶏を用いたが、今後、各地鶏について測定する鶏の数を増やし、比較を行う予定にしている。

6. 今後の課題

本プロジェクトにおいて、東京しゃも、名古屋コーチン、比内地鶏、はかた地どりのムネ肉並びにモモ肉の食味性、香気成分分析、ならびに硬さの評価を行い、各地鶏に違いがあるか否かを検討した。

その結果、食味性において、4種類の地鶏にそれぞれ特徴が認められた。今後は、それぞれの違いをもたらす香気成分をさらに解析し、寄与因子を明確にすることが重要である。また、各地鶏の特長を引き出すための調理方法を解明することも次の課題である。

各地鶏の特長をもたらす寄与因子並びにそれを引き出す調理方法が解明されれば、地鶏の良さをさらに広めることができることが期待できる。

【参考文献】

- 1) 扇元敬司、堇澤圭二郎、桑原正貴ら編、最新畜産ハンドブック、pp. 29、講談社（2014）
- 2) 都築政起著、古瀬充宏編、ニワトリの科学、pp. 8、朝倉書店（2016）
- 3) 藤尾芳久、日本鶏の血液型と渡来経路、日本在来家畜調査団報告 5、5-12（1974）
- 4) Babizhayev M., Yegorov Y., *Recent Patents on Drug Delivery and Formulation*, 9, 1-64 (2015)
- 5) 西村敏英、「食べ物のおいしさとうま味成分」、月刊フードケミカル、'08-1'、49-53（2008）
- 6) 松石昌典、久米淳一、伊藤友己、高橋道長、荒井正純、永富 宏、渡邊佳奈、早瀬文孝、沖谷明紘、日本畜産学会報、75, 4099-415 (2004)
- 7) Gasser U., Grosch W., *Z. Lebensm. Unters. Forsch.*, 190, 3-8(1990)
- 8) Takakura Y., Mizushima M., et al. *Food Science and Technology Research*, 20, 109-113 (2014)
- 9) 西村敏英、「地鶏のおいしさと熟成」、調理食品と技術（日本調理食品研究会）、12、101-107（2006）



日本中央競馬会
特別振興資金助成事業

平成29年度地鶏銘柄鶏振興緊急対策事業

〔地鶏特性解明調査 報告書Ⅱ〕

2018年3月 発行

発 行：一般社団法人 日本食鳥協会

住 所：〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-9-7 RECビル7階

電 話：03-5833-1029(トリニク)



